

הוראות לאחר ניתוח

-מתן שתייה, ואם בע"ח אינו מקיא כעבור חצי שעה, ניתן לתת רבע מכמות המזון הרגילה על מנת שלא יקיא.

-ייתכן ותהיה הקאה צהובה עקב סחרחורת לאחר נסיעה או בחילה. אם ההקאות נמשכות יש ליצור קשר עם המרפאה.

-הגבלת פעילות למשך יומיים לפחות, להימנע מקפיצות או עלייה במדרגות, על מנת למנוע אפשרות של פתיחת תפרים פנימיים ודימומים. להימנע מלחץ או נגיעה באזור הניתוח.

-מתן תרופות לפי המינון. אם ישנן.

-הוצאת תפרים בתאריך _____ (אם ישנם).

-בכל מקרה של עייפות, חוסר תיאבון, חולשה, רעידות, אפאתיה ללא סימני התאוששות לאחר 24 שעות, נא ליצור קשר עם המרפאה.

-במידה וישנה סכנה להוצאת תפרים עקב ליקוקים או נשיכות בקצוות החוטים, יש לרכוש קולר אליזבטני אשר מולבש מסביב לצוואר, ומונע גישה של הפה לכל חלקי הגוף.

-----ד"ר שי פייס-רופא וטרינר-----

-----מ.ר. 1550-----

לחירום: 0525-944949

מרפאה: 077-2038383